



# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ**



**HIV** : Ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου

**AIDS** : Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που προκαλείται από το HIV (Τελικό στάδιο HIV λοίμωξης-νόσηση)

**Φορέας ή οροθετικός**: Θετικός στον ιό HIV στο αίμα , δύναται αν δε λάβει την κατάλληλη αντιρετροϊκή αγωγή να νοσήσει παρουσιάζοντας τα συμπτώματα του AIDS



Είναι ένας ιογενής «σύντροφος ζωής» για περισσότερα από 35 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως 3,2 εκατομμύρια εξ αυτών είναι παιδιά.

Είναι μια επιδημία που καίει τον πλανήτη τα τελευταία και πλέον χρόνια συγκεκριμένα από το 1981, οπότε και περιγράφηκε ο ιός HIV που προκαλεί το AIDS από ειδικούς των κέντρων για τον έλεγχο και την πρόληψη νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Μια επιδημία που ξεκίνησε με πολλή άγνοια, φόβο και θάνατο, αλλά μέσα από τις επιστημονικές προσπάθειες όλων αυτών των δεκαετιών έχει πλέον δαμαστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό και εκατομμύρια ασθενείς έχουν κατά το δυνατό φυσιολογική ζωή με ποιότητα.

# ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ

- ▶ Αίμα
- ▶ Σπέρμα και προσπερματικά υγρά
- ▶ Κολπικά υγρά
- ▶ Πρωκτικά υγρά
- ▶ Μητρικό γάλα

# ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- ▶ Κοινή χρήση σύριγγας κατά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών
- ▶ Μη επαγγελματικό τατουάζ και τρύπημα αυτιών κλπ.
- ▶ Τρύπημα στο χώρο εργασίας με μολυσμένες σύριγγες
- ▶ Μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος
- ▶ Τοκετός
- ▶ Θηλασμός



**Ο κίνδυνος μετάδοσης εξαρτάται από  
το τύπο της έκθεσης αλλά και από:**

Τη μολυσματικότητα (αυξημένο ιικό  
φορτίο αυξάνει τον κίνδυνο)


Γεννητικά, στοματικά έλκη και  
αιμορραγίες αυξάνουν τον κίνδυνο

Τρυπήματα, ιν ένεσεις αυξάνουν τον  
κίνδυνο

HIV διαγνώσεις κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2018 (δεν περιλαμβάνονται άτομα στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης)

HIV diagnoses by transmission group in Greece reported by 31/12/2018  
(cases with undocumented transmission mode were excluded)

- Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών - Sex between men
- Ετεροφυλοφυλική σεξουαλική επαφή - Heterosexual contact
- Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - Injecting drug use
- Πολυμειταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος - Multitransfusion of blood and blood products
- Μειάγγιση - Transfusion
- Κάθετη μειάδοση - Mother-to-child



# ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ

- ▶ Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρانا ή ούρα
- ▶ Αγκαλιά
- ▶ Φιλί
- ▶ Μασάζ
- ▶ Χειραψία
- ▶ Τσιμπήματα εντόμων
- ▶ Συγκατοίκηση με κάποιον οροθετικό
- ▶ Κοινή χρήση τουαλέτας ή ντους



# ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- ▶ Πνευμονικές
- ▶ Γαστρεντερικές
- ▶ Νευρολογικές
- ▶ Δερματικές εκδηλώσεις
- ▶ Κακοήθειες
- ▶ Λοιμώξεις γυναικείων γεννητικών οργάνων
- ▶ Χρόνιες νόσοι

Η νόσος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1978 σε πέντε ομοφυλόφιλους της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Χαρακτηρίζεται ως:

**Σύνδρομο** γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο συμπτωμάτων

**Ανοσολογική ανεπάρκεια** λόγω εξασθένησης του οργανισμού να αναγνωρίσει τους ιούς που τον προσβάλλουν

**Επίκτητη** γιατί αποκτιέται και δεν κληρονομείται.





## Τα βασικά προβλήματα:

Τα υψηλά ποσοστά διαγνώσεων

Η κλιμακούμενη έλλειψη αντιρετροϊκών φαρμάκων

Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Η έλλειψη αντιδραστηρίων για τη μέτρηση του ιικού φορτίου

Οι ανεπαρκείς παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας.



## 2018 τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα...

- ▶ 37,9 εκατομμύρια [32,7 εκατομμύρια - 44,0 εκατομμύρια] άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με τον ιό HIV.
- ▶ 23,3 εκατομμύρια άτομα [20,5 εκατομμύρια-24,3 εκατομμύρια] είχαν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία.
- ▶ 1.7 εκατομμύρια άνθρωποι [1.4 εκατομμύρια - 2.3 εκατομμύρια] προσβλήθηκαν πρόσφατα με τον ιό HIV.
- ▶ 770 000 [570 000-1,1 εκατομμύρια] άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS.
- ▶ 74,9 εκατομμύρια [58,3 εκατομμύρια-98,1 εκατομμύρια] άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV από την έναρξη της επιδημίας.



BY 2020

90

90% DIAGNOSED

90

90% ON TREATMENT

90

90% VIRALLY SUPPRESSED



Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV θα γνωρίσουν το HIV.

Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ατόμων με διαγνωσθείσα λοίμωξη από τον ιό HIV θα λάβει σταθερή αντιρετροϊκή θεραπεία.

Μέχρι το 2020, το 90% όλων των ανθρώπων που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία θα έχει ιική καταστολή.



## ΣΤΟΧΟΙ

- Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και επαγρύπνηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας
- Εκπαίδευση
- Πρόληψη της διασποράς κατά την νοσηλεία των ασθενών
- Έλεγχος των φορέων
- Ενημέρωση του πληθυσμού

# ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- ▶ Αξιολόγηση των αναγκών
- ▶ Προγραμματισμό της φροντίδας
- ▶ Εφαρμογή κατάλληλων νοσηλευτικών παρεμβάσεων
- ▶ Κάλυψη αναγκών
- ▶ Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της φροντίδας



# ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- ▶ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
- ▶ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
- ▶ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΙΜΑ Ή ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ
- ▶ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ



# ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

- ▶ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
- ▶ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΩΣΗ
- ▶ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ▶ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
- ▶ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ▶ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
- ▶ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- ▶ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ▶ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
- ▶ ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

# ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ

- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
- ▶ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ
- ▶ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
- ▶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Μια από τις ευπαθείς ομάδες που βιώνουν έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλα τα επίπεδα είναι οι ασθενείς και φορείς του HIV. Με την έλευση του το AIDS στις αρχές τις δεκαετίας του '80 έγινε αντικείμενο κοινωνικής προσοχής, δημόσιας αναγνώρισης και συζήτησης.



Οι ασθενείς με AIDS έρχονται παράλληλα αντιμέτωποι με δύο πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα:

1. Την απόρριψη από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
2. Η απώλεια εργασίας



# Η Οργάνωση της ζωής του ασθενή

ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΧΕΜΥΘΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ



# Οικογένεια και ασθενής

1. Να αποδεχθούν και να υιοθετήσουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.
2. Να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης της χρόνιας ασθένειας και των επακόλουθων της .
3. Να αναζητούν πληροφόρηση για την ασθενή.
4. Προσαρμογή και υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής .
5. Αναζήτηση βοήθειας και στήριξης από τους άλλους.
6. Πνευματικές αξίες και οικογένεια ατόμου με χρόνια ασθένεια

### 1. Η Απορριπτική Οικογένεια.

Ο τύπος της οικογένειας αυτής δεν παραχωρεί διευκολύνσεις προς το ασθενές της μέλος.

### 2. Η Υπερπροστατευτική Οικογένεια.

Ο τύπος αυτός της οικογένειας επικεντρώνει όλη την προσοχή στο ασθενές της μέλος.


### 3. Η Προσαρμοστική Οικογένεια.

Ο τύπος αυτός της οικογένειας συμπαραστέκεται στο ασθενές της μέλος, χωρίς να παραμελεί και να θυσιάζει τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών της.

# Στάση κοινωνίας

Ο φορέας ή ασθενής του AIDS έχει τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα όπως κάθε άλλος άνθρωπος και αυτό δεν είναι μόνο θέμα της νομοθεσίας αλλά περισσότερο είναι θέμα παιδείας και διαφώτισης καθώς επίσης και θέμα καλλιέργειας της ηθικής ευαισθησίας του κάθε ατόμου.






Η HIV λοίμωξη έχει μετασχηματιστεί πλέον από μια θανατηφόρα ανίατη ασθένεια με έντονο κοινωνικό στίγμα σε ένα χρόνια πρόβλημα υγείας, πολύ καλύτερα αντιμετωπίσιμο πλέον σε σχέση με άλλα χρόνια νοσήματα, με διατήρηση πολύ καλής ποιότητας ζωής και με ολοένα και υψηλότερα επίπεδα πλήρους κοινωνικής ένταξης των ατόμων που φέρουν τη λοίμωξη.

***Είναι ενδεικτικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ο όρος «people living with HIV infection/AIDS» και όχι ο όρος «ασθενής» ή παρόμοιος.***


# Νοσηλευτικές παρεμβάσεις





- 
- Ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση του ασθενή και της οικογένειάς του.
  - Διδασκαλία αυτοπροστασίας, αυτοφροντίδας και προστασία του περιβάλλοντος.
  - Ενθάρρυνση και καθοδήγηση για να αναλάβει ο ίδιος ο ασθενής την ευθύνη της φροντίδας της υγείας του.



Οι σκοποί της νοσηλευτικής  
υπηρεσίας


- 
- Παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας
  - Επαρκή στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων
  - Άσκηση αποτελεσματικής διοικήσεως των νοσηλευτικών τομέων
  - Υποστήριξη εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων, καθώς και κατάρτιση και εφαρμογή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό υγείας .

- 
- Ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών νοσηλευτικών προγραμμάτων
  - Συμμετοχή στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα του νοσοκομείου
  - Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου
  - Η ποιοτική περίθαλψη των φορέων και ασθενών με HIV/AIDS



Το προσωπικό υγείας και ιδιαίτερα οι νοσηλευτές που επωμίζονται τη φροντίδα του ασθενή με AIDS πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένο στη λεπτή ισορροπία που απαιτείται για την εφαρμογή των προφυλακτικών μέτρων, να αναγνωρίζουν την αξιοπρέπεια και να προστατεύουν την ατομικότητα του ασθενή, να τον βλέπουν ως μοναδική και ανεπανάληπτη βιοψυχοκοινωνική και πνευματική οντότητα και τέλος να είναι σε θέση να αξιολογούν σωστά τόσο την φυσική όσο και την ψυχική κατάσταση του ασθενή.

Συνεπώς η εξατομικευμένη φροντίδα του ασθενή με AIDS χρειάζεται επιδεξιότητα, ακρίβεια και εχεμύθεια. Αυτά βασίζονται στην πραγματική γνώση των σύγχρονων μοντέλων νοσηλευτικής που προορίζονται να δώσουν στον ασθενή υψηλή ποιότητα νοσηλείας με πραγματικό ενδιαφέρον.



1η Δεκεμβρίου

**ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΗΜΕΡΑ  
ΑΙΔΟΣ**





Οι άνθρωποι  
που ζουν με HIV  
ζουν όπως  
κάθε άνθρωπος

---

Η άγνοια  
είναι  
μεταδοτική



Έχει επιβιώσει ότι ο HIV είναι ένας  
έξυπνος ιός. Ο ίδιος μας δείχνει και  
τον τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε.  
Ο HIV και το AIDS δεν κάνουν  
κοινωνικές διακρίσεις είναι καιρός  
να σταματήσουμε να κάνουμε και  
εμείς.



Ευχαριστώ πολύ

