

ΗIV λοίμωξη: κλινική πορεία και ταξινόμηση

Γαρυφαλλιά Πουλάκου,
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος,
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Γ' Παθολογική κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ “Σωτηρία”



Εξέλιξη της HIV Λοίμωξης






Figure 1: The natural course of HIV infection

The higher the viral set point the faster the decrease of CD4 T cells



Risk for AIDS according to CD4-cellcount, HIV-RNA and age




Figure based on data from Phillips et al. CASCADE Colaboration. AIDS 2004; 18 (1): 51-58.

Figure 2: Risk for AIDS according to CD4-cellcount, HIV-RNA and age

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
ANNUAL EDITION OF THE NATIONAL PUBLIC HEALTH ORGANIZATION (N.P.H.O.)



Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Υγείας
Hellenic Democracy / Ministry of Health




ΗIV λοίμωξη: προκαταρκτικά επιδημιολογικά δεδομένα, Οκτώβριος 2020



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, μέχρι και την 31^η Οκτωβρίου του 2020, έχουν καταγραφεί στον ΕΟΔΥ 18.574 περιστατικά ΗΙV λοίμωξης (82.61% άνδρες). Από το σύνολο των ατόμων αυτών, 4.414 έχουν εμφανίσει



Σχήμα 1. Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού (περίοδος Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010-2020).


Παραμένει η HIV Λοίμωξη νόσος κυρίως των MSM στην Ελλάδα?



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΕΙΨ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





2020 Oct

**HIV 471
(MEN 367)**

Κατηγορία μετάδοσης HIV λοίμωξης ανά έτος διάγνωσης
(Ιανουάριος-Οκτώβριος 2010-2020)







Τα άτομα με HIV λοίμωξη παρακολουθούνται, νοσηλεύονται και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή από τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) που βρίσκονται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία της Αθήνας και μεγάλων αστικών κέντρων της περιφέρειας.



**Πάσχοντες από HIV λοίμωξη
πεθαίνουν γρήγορα?**

Η ανατροπή ενός διαχρονικού μύθου

Antiretroviral Therapy Dramatically Increases Life Expectancy for HIV-Infected Individuals

People Living With HIV Infection = PLWHIV

ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV, ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ >69 ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ



Targets for ending the AIDS epidemic

by 2020

90-90-90

Treatment

500 000

New Infections among adults

ZERO

Discrimination

by 2030

95-95-95

Treatment

200 000

New Infections among adults

ZERO

Discrimination

49%

In the EU/EEA, almost **every second HIV diagnosis happened at a late stage in 2017**. This means diagnosis several years after infection.*




*of all cases with available CD4 cell count

Source: ECDC-WHO/Europe, HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 (2017 data)



Καθυστερημένη διάγνωση

Figure 1.7: Proportion of persons diagnosed late (CD4 cell count < 350 per mm³) by demographic, EU/EEA, 2016




Διαγνώσεις AIDS

- Ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων AIDS που δηλώθηκαν στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018, ανέρχεται σε 4.210, εκ των οποίων 3.523 (83,7%) ήταν άνδρες και 687 (16,3%) γυναίκες
- Το 2018 διαγνώστηκαν 100 περιστατικά AIDS, εκ των οποίων 87 (87%) ήταν άνδρες και 13 (13%) γυναίκες
- Το 43% των νέων περιπτώσεων AIDS ήταν άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, ενώ στο 12% των περιπτώσεων AIDS, η μετάδοση είχε γίνει μέσω ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
- Η πλειονότητα των νέων περιπτώσεων AIDS αφορά σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών κατά τη διάγνωση με το μεγαλύτερο ποσοστό να παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών




Διαγνώσεις AIDS κατά έτος διάγνωσης και κατά φύλο στην Ελλάδα

AIDS diagnoses in Greece by year of diagnosis and sex



Θάνατοι σε άτομα με AIDS, κατά έτος θανάτου και κατά φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2018

Deaths among AIDS cases by year of death and sex in Greece by 31/12/2018



Περίπτωση 1^η

Άνδρας 54 ετών επισκέπτεται το γιατρό του για
εξάνθημα με χαρακτήρες έρπητα ζωστήρα

Ο θεράπων παρατηρεί ότι οι βλάβες έχουν κατανομή
περισσότερων του ενός δερμοτομιών

Τι μπορεί να υποκρύπτεται

1. Λήψη ανοσοκατασταλτικών
2. Αιματολογική κακοηθεια
3. HIV Λοίμωξη
4. Όλα τα ανωτέρω



Περίπτωση 1^η

Άνδρας 54 ετών επισκέπτεται το γιατρό του για εξάνθημα με χαρακτηρισές έρπητα ζωστήρα

Ο θεράπων παρατηρεί ότι οι βλάβες έχουν κατανομή περισσότερων του ενός δερμοτομιών

Τι μπορεί να υποκρύπτεται

1. Λήψη ανοσοκατασταλτικών
2. Αιματολογική κακοηθεια
3. HIV Λοίμωξη
4. Όλα τα ανωτέρω




ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2^η

- Άνδρας, 27 ετών, προσέρχεται για εμπύρετο έως 39 από τετραημέρου.
- Κεφαλαλγία, έντονη κόπωση, κυνάγχη και ναυτία.
- Από 12ώρου επιδείνωση με σύγχυση, λήθαργο.
- Ατομικό αναμνηστικό: ελεύθερο
- Αντικειμενική εξέταση:
 -
 -
 -
 -



Περίπτωση 2^η

- Γενική αίματος:
 - Hb 14,3 g/dl, λευκά 9.700/dl (ουδ./λεμφ./μον. 56%/28%/6%) , αιμοπετάλια 112.000/dl
- Βιοχημικός έλεγχος: φυσιολογικός
- Ακτινογραφία θώρακος. ΗΚΓ: χωρίς ευρήματα.
- ΟΝΠ μετά από CT εγκεφάλου
 - Διαυγές υγρό, 110 κύτταρα (95% λεμφοκ.), πρωτεΐνη 75mg/dl, γλυκόζη 65mg/dl (στον ορό 92mg/dl).
 - Άμεση Gram χρώση : αρνητική



Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση

1. Πρωτολοίμωξη από HIV (οξύ ρετροϊκό σύνδρομο)
2. Οξεία τοξοπλάσμωση
3. Οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα
4. Προχωρημένη HIV λοίμωξη



Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση

1. **Πρωτολοίμωξη από HIV (οξύ ρετροϊικό σύνδρομο)**
2. Οξεία τοξοπλάσμωση
3. Οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα
4. Προχωρημένη HIV λοίμωξη



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

- Πρωτογενής HIV λοίμωξη ονομάζεται η περίοδος που μεσολαβεί από την μόλυνση του ατόμου έως την εμφάνιση αντισωμάτων έναντι του ιού
- Κλινική συμπτωματολογία (οξύ ρετροϊκό σύνδρομο) εμφανίζεται στο 50-90% των ατόμων που μολύνονται με τον HIV



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΣΗΜΕΙΑ

- Πυρετός (>75%)
 - Κόπωση
 - Εξάνθημα (40-80%)
 - Μυαλγίες, αρθραλγίες
 - Κεφαλαλγία, φωτοφοβία (32-70%)
 - Ναυτία, έμετοι, διάρροιες
 - Νυκτερινοί ιδρώτες
 - Λεμφαδενοπάθεια (40-80%)
 - Φαρυγγίτιδα (>50%)
 - Έλκη στοματικής κοιλότητας / γεννητικών οργάνων (10-15%)
 - Ηπατοσπληνομεγαλία (14%)
- ## Άτυπη συμπτωματολογία
- Ηπατίτιδα
 - Λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα
 - Αγγειίτιδα
 - Guillan-Barré



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

- Λευκοπενία (40%), συχνά με παρουσία άτυπων λεμφοκυττάρων
- Θρομβοπενία (45%)
- Αύξηση SGOT/SGPT (21%)
- Άσηπτη μηνιγγίτιδα (24%)



Οξύ ρετροϊικό σύνδρομο



- συνήθως 1-4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση
- συμπτώματα μη ειδικά, διάρκειας συνήθως < 2 εβδ (έως και 10 εβδομάδες).
- περίοδος ιδιαίτερα μολυσματική
- **σωστή διάγνωση στα ΤΕΠ: 19-26 %**
- 1 % των ασθενών με Mono test (-) λοιμώδη μονοπυρήνωση
- ορολογικός έλεγχος αρνητικός
- PCR για τον ιό θετική σε υψηλούς τίτλους

δδ: μονοπυρήνωση, τοξοπλάσμωση, ερυθρά, σύφιλις, ιογενείς ηπατίτιδες, διάσπαρτη γονοκοκκική λοίμωξη, φαρμακευτικό εξάνθημα, ιώσεις.

ΗIV ΛΟΙΜΩΞΗ

ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΗIV λοίμωξη → χρόνια ιογενής νόσος

α.

β.

γ.



- Εκδηλώσεις ανοσοκαταστολής (λοιμώξεις, νεοπλάσματα)

Εκδηλώσεις άμεσα οφειλόμενες στον ιό

Εκδηλώσεις που συνδέονται με την λήψη αντιρετροϊκής
θεραπείας

Στάδια της HIV Λοίμωξης κατά CDC (1993)

CD4+ T/μl	Ασυμπτωματικοί Πρωτολοίμωξη ΠΓΛ	Συμπτωματικοί (όχι A ή C)	Κατάσταση που προσδιορίζει AIDS
>500	A1	B1	C1
200-499	A2	B2	C2
<200	A3	B3	C3

Προοδευτική Γενικευμένη Λεμφαδενοπάθεια

Whereas in Europe the term AIDS is only used in cases of clinically manifest AIDS, in the US a CD4 T cell count below 200 cells/μl is also considered AIDS.


CDC 2008 revised classification

Table 4: Classification of HIV-disease according to the revised classification (2008)

Stage	AIDS-defining illness*	CD4 T cell count
1	None	>500/ μ l or \geq 29%
2	None	200–499/ μ l or 14–28%
3 (AIDS)	Documented AIDS-defining illness	<i>or</i> <200/ μ l or <14%
unknown	No information available	No information available

The case definitions of the revised 2008 CDC classification are intended for public health surveillance and not as a guide for clinical diagnosis.

AIDS Case Definition



Καταστάσεις που καθορίζουν το κλινικό στάδιο A

- Ασυμπτωματική λοίμωξη
- Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια
- Οξύ ρετροϊικό σύνδρομο (σύνδρομο ορομετατροπής)

Καταστάσεις που καθορίζουν το κλινικό στάδιο B (έφηβοι-ενήλικες, 1993)

- Βακτηριακή αγγειωμάτωση
- Καντιντίαση (στοματοφαρυγγική αιδοιοκολπική)
- Δυσπλασία τραχήλου-καρκίνος *in situ*
- Συστηματικές εκδηλώσεις (πυρετός $>38,5^{\circ}\text{C}$ ή διάρροια >1 μήνα)
- Τριχωτή λευκοπλακία γλώσσας
- Έρπης ζωστήρ >1 νευροτόμια
- Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
- Λιστερίωση
- Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (+/- σαλπινγγοθηκικό απόστημα)
- Περιφερική νευροπάθεια





Καταστάσεις που καθορίζουν το στάδιο C/AIDS (ενήλικες, 1997)

- Καντιντίαση οισοφάγου, τραχείας, βρόγχων ή πνευμόνων
- Κοκκιδιοειδομύκωση εξωπνευμονική
- Κρυπτοσποριδίαση με διάρροια
- Κρυπτοκόκκωση εξωπνευμονική
- CMV εκτός από ήπαρ
- Ιστοπλάσμωση εξωπνευμονική
- Ισοσπόρωση με διάρροια
- Πνευμονία από *pneumocystis jirovecii*
- Απλός έρπης με έλκος > 1 μήνα ή πνευμονίτιδα, βρογχίτιδα, οισοφαγίτιδα
- Σύνδρομο απίσχνασης σχετιζόμενο με τον ιό HIV
- Άνοια συσχετιζόμενη με τον ιό HIV
- Σάρκωμα Kaposi's
- Καρκίνος τραχήλου μήτρας
- Βακτηραιμία από *Salmonella (non-typhi)* υποτροπιάζουσα
- Διάσπαρτη λοίμωξη από *Mycobacterium avium*
- Λοίμωξη από *Mycobacterium tuberculosis*, πνευμονική-εξωπνευμονική
- Λέμφωμα (Burkitt's, ανοσοβλαστικό, πρωτοπαθές εγκεφάλου)
- Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

Ποιόν προσερχόμενο στο ιατρείο μου θα στείλω να εξετασθεί για λοίμωξη από τον ιό HIV?

- 1. Άτομο με ανεξήγητες «πενίες» στη γενική αίματος πχ θρομβοπενία**
- 2. Άτομο με διάγνωση σεξουαλικά μεταδιδόμενου νοσήματος**
- 3. Ασθενή με ανεξήγητο εμμένον εμπύρετο, διάρροια και απώλεια βάρους**
- 4. Ασθενή με ανεξήγητη άνοια, άσηπτη μηνιγγίτιδα ή περιφερική νευροπάθεια**

**ΣΤΕΛΝΩ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ**

ΜΥΘΟΣ

Σε ποιον ακόμη πρέπει να προτείνω να εξεταστεί;

ΥΠΟΠΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

- Λοιμώξεις και νεοπλάσματα σχετιζόμενα με AIDS
- Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, ανεξήγητη άνοια, άσηπτη μηνιγγίτιδα ή περιφερική νευροπάθεια,
- Χρόνιος απλός έρπης, έρπης ζωστήρα >2νευροτόμια,
- Μυκητίαση στόματος, τριχωτή λευκοπλακία
- >2 επεισόδια βακτηριακής πνευμονίας/έτος
- Βακτηριαμική σαλμονελλική λοίμωξη
- Σύνδρομο ορομετατροπής
- Φυματίωση

- Διαφύλαξη της ανοσολογικής λειτουργίας¹
 - Μείωση θνητότητας^{1,2}
 - Μείωση στα καθοριστικά νοσήματα για AIDS^{1,2}
 - Μείωση στις συννοσηρότητες:^{1,2}
 - Καρδιαγγειακή νόσος^{1,2}
 - Νεφρική νόσος^{1,2}
 - Ηπατική νόσος^{1,2}
 - Non-AIDS καρκίνοι^{1,2}
 - Νευρολογικά νοσήματα¹
1. Gunthard H et al. *JAMA* 2014;312(4):410–425
 2. DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents

- Ασθενής ηλικίας 42 ετών, έγγαμος και πατέρας 2 τέκνων με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό
- Προσέρχεται με επίμονες διαρροϊκές κενώσεις, απώλεια βάρους από εξαμήνου και πυρετική κίνηση από μηνός
- Επί 2 έτη παρακολουθείται και υποβάλλεται σε : γαστροσκόπηση, 2 κολονοσκοπήσεις με βιοψίες, μια ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου με κάψουλα, υπερηχογράφημα κοιλίας, CT, MRI, έλεγχο για αυτοάνοσα νοσήματα
- Τα μόνα ευρήματα: ενδοκοιλιακοί λεμφαδένες και ιστιοκυτταρική κολίτιδα
- Εμπειρικές θεραπείες με κορτικοειδή, μεσαλαζίνη, αντιβιοτικά και αντιπαρασιτικά

Διάγνωση

Περίπτωση 4^η

- Άνδρας 40 ετών, ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό
- Από δύο εβδομάδων προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, πυρετός, μη παραγωγικός βήχας
- Από 20ημέρου αναφέρει δυσάρεστη γεύση και κάψιμο όταν τρώει ξινά ή αλμυρά
- Αναπνοές 20/min, SpO₂ 90%





ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Ασθενής δυσπνοϊκός και ταχυπνοϊκός
- Αναπνευστικό ψιθύρισμα φυσιολογικό, χωρίς επιπρόσθετους ήχους
- Στοματική κοιλότητα και φάρυγγας καλύπτονται από λευκωπό παχύ επίχρισμα
- Λοιπή κλινική εξέταση χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα
- Αέρια αίματος:
pO₂: 68mmHg, pCO₂: 28mmHg



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



2 ημέρες αργότερα
Αμφοτερόπλευρα διηθήματα δίκην θαμβής υάλου



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

- Στον ασθενή εστάλη HIV ELISA και ήταν θετική
- Επιβεβαίωση με WB
- Έλεγχος για HIV: RNA 453.120 αντίγραφα/ml, CD4 135/ml



Ερώτηση

Πόσες καιροσκοπικές λοιμώξεις έχει ο ασθενής μου?

- 1. Μία, τα συμπτώματά του πρέπει να τα εντάξουμε σε νόσηση από το ίδιο παθογόνο**
- 2. Δύο (αυτή που προσβάλλει τον πνεύμονα και αυτή που προσβάλλει το στοματοφάρυγγα)**
- 3. Δύο αλλά μπορεί και περισσότερες**
- 4. Καμία: όλα είναι εκδηλώσεις του ιδίου του ιού HIV**



Ερώτηση

Πόσες καιροσκοπικές λοιμώξεις έχει ο ασθενής μου?

1. Μία, τα συμπτώματά του πρέπει να τα εντάξουμε σε νόσηση από το ίδιο παθογόνο
2. Δύο (αυτή που προσβάλλει τον πνεύμονα και αυτή που προσβάλλει το στοματοφάρυγγα)
3. **Δύο αλλά μπορεί και περισσότερες**
4. Καμία: όλα είναι εκδηλώσεις του ιδίου του ιού HIV



**Η «αλήθεια» στην HIV λοίμωξη
είναι ότι στον ίδιο ασθενή
«χωράνε» πολλαπλά παθογόνα
και σενάρια στην ίδια κλινική
εικόνα**

**Η κατάρριψη μιας βασικής αρχής στην ιατρική
διαγνωστική σκέψη**

Περίπτωση 4^η

Πορεία νόσου και διαγνώσεις

- Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος: *Candida albicans*
 -
- Βρογχοσκόπηση – BAL θετικό για *Pneumocystis jiroveci*
 -

Δερματική βλάβη θώρακα συμβατή με σάρκωμα Kaposi
Έγινε βιοψία που επιβεβαίωσε τη διάγνωση



HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις

- Προσβολή από καιροσκοπικά παθογόνα
- Τροποποιημένη πορεία και εκδηλώσεις συνήθων λοιμώξεων
- Λοιμώξεις που εμφανίζονται αναλόγως του βαθμού της ανοσοκαταστολής
 - Ανάγκη πρωτογενούς ή δευτερογενούς χημειοπροφύλαξης
- Άμεση επίδραση στο προσδόκιμο επιβίωσης
- Θεραπεία = ύφεση συμπτωμάτων χωρίς εκρίζωση
- Συχνά > 1 είδος λοίμωξης

Οι συχνότερες ενδεικτικές νόσοι AIDS στην Ελλάδα

Το 2018, οι πέντε συχνότερα εμφανιζόμενες ενδεικτικές νόσοι κατά τη διάγνωση του AIDS ήταν:

- η πνευμονία από *Pneumocystis jirovecii* (44%),
- η πνευμονική λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης,
- το σάρκωμα Καρosi και το σύνδρομο απίσχνανσης σε ίσο ποσοστό 12%
- και η εξωπνευμονική λοίμωξη οφειλόμενη στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (10%)

Θάνατος από AIDS : 40 άτομα το 2018



HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις – πνευμονία από *P. carinii* (PCP) *jirovecii*

Μυκητιασική λοίμωξη – **CD4 <200**

Η συχνότερη προσδιοριστική του AIDS νόσος

Προσβολή κατώτερου αναπνευστικού

Μακρά έρπουσα πορεία με αιφνίδια επιδείνωση


Δύσπνοια στην κόπωση, ταχύπνοια,

ξηρός βήχας, υποξαιμία, πυρετός

Απουσία αντικειμενικών ευρημάτων, ατυπία ακτινολογικών

Εξωπνευμονικές εντοπίσεις

Απαιτεί πρωτογενή και δευτερογενή προφύλαξη



HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις – εγκεφαλίτις από *Toxoplasma gondii*

Πρωτοζωική λοίμωξη – **CD4 <100**



95% επανενεργοποίηση λανθάνουσας λοίμωξης (IgG θετικά)

Εστιακά νευρολογικά σημεία (70%), σύγχυση(60%), κεφαλαλγία(55%), πυρετός(50%), σπασμοί(33%), οξείας ενάρξεως


MRI: πολλαπλές δακτυλιοειδείς χωροκατακτητικές βλάβες, <2εκ., με οίδημα

Άλλες εντοπίσεις: πνευμονίτις, μυοκαρδίτις, αμφιβληστροειδίτις, διάσπαρτη νόσος, κ.α.

Απαιτεί πρωτογενή και δευτερογενή προφύλαξη (υποτροπή 60-80%)



Toxoplasma gondii
encephalitis



HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις - φυματίωση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της HIV λοίμωξης, προσδιοριστική του AIDS



100-200 φορές πιο συχνή σε οροθετικούς ασθενείς

Όταν $CD4 < 150$, άτυπη κλινική και ακτινολογική εικόνα, συχνές εξωπνευμονικές εντοπίσεις, αρνητικές χρώσεις, συχνή η τοξικότητα των φαρμάκων, αυξημένη ευαισθησία αιμοκαλλιέργειας

Συμπτώματα μη ειδικά: πυρετός, νυκτερινοί ιδρώτες, θωρακικό άλγος, χρόνιας παραγωγικός βήχας


Θεραπεία όπως στον κοινό πληθυσμό, δεν απαιτείται δευτερογενής προφύλαξη

Χημειοπροφύλαξη επί θετικής Mantoux





Κεγχροειδής Φυματίωση



Απόστημα εγκεφάλου φυματιώδους αιτιολογίας

Λοιμώσεις – κρυπτοκοκκική μηνιγγίτις

Μυκητιασική λοίμωξη – *Cryptococcus neoformans* – **CD4 < 50**

Συχνή, προσδιοριστική του AIDS


Εκδηλώσεις: κεφαλαλγία(75%), πυρετός(65%), διαταραχή συμπεριφοράς(40%), δυσκαμψία αυχένος(25%), νευρολογικά σημεία(15%)

10% ασυμπτωματική, 10-40% χωρίς νευρολογικά σημεία

Χαρακτηριστικό ENY, ανίχνευση αντιγόνου στον ορό και στο ENY, υψηλή ευαισθησία καλλιιεργειών

Άλλες εντοπίσεις: δέρμα, πνεύμονες

Απαιτείται δευτερογενής προφύλαξη.





Κρυπτοκόκκωση

HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις – *Candida sp*

★ Στοματίτιδα:

•

•

Κολπίτιδα

★ Οισοφαγίτιδα

★ •

•

•



HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις – CMV αμφιβληστροειδίτιδα

Καθοριστική του AIDS – **CD4 <50**

Ασυμπτωματική ή με συμπτώματα αποκόλλησης (λάμψεις, σκοτώματα)

Κλινική + οφθαλμοσκοπική διάγνωση



Χωρίς θεραπεία : μη αναστρέψιμη τύφλωση, κανόνας οι υποτροπές

Προηγείται ιαιμία(CMVDNA), ασυμπτωματική ή με πυρετό, κακουχία, νυκτερινούς ιδρώτες

Απαιτείται δευτερογενής πρόληψη

Άλλες εντοπίσεις: πνευμονίτιδα,
εγκεφαλίτιδα, επινεφριδίτιδα,
οισοφαγίτιδα, κολίτιδα





CMV πνευμονίτιδα

VZV > 1 δερμοτόμιο
Μολυσματική τέρμινθος (pox virus), Κονδυλώματα





HSV Εκτεταμένη δερματική μορφή



**Ουλοστοματίτις-
αφθώδης στοματίτις**



HSV Στοματίτις



HSV πρωκτού-περινέου

HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Λοιμώξεις – κοινά παθογόνα

S. pneumoniae, H. influenzae:


P. aeruginosa

S. aureus

Salmonella

Leishmania


T. Pallidum




Νεκρωτική
ουλοστοματίτις

Μολυσματικό κηρίο





Απόστημα εγκεφάλου



Νοκάρδια

HIV λοίμωξη : κλινικές εκδηλώσεις

Νεοπλάσματα που χαρακτηρίζουν την HIV λοίμωξη

-
-
-
-


Σάρκωμα Καρσι




Εκδηλώσεις της HIV λοιμώξεως που οφείλονται στον HIV

- Σύνδρομο απίσχνασης (Wasting syndrome)
- HIV αμφιβληστροειδοπάθεια
- HIV νεφροπάθεια
- HIV μυοκαρδιοπάθεια
- Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση
- Αιματολογικές διαταραχές (μυελοδυσπλασία, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα)
- Εκδηλώσεις από το πεπτικό (αφθώδης στοματίτις, χ. διαρροϊκό, σκληρυντική χολαγγειίτις)
- Εκδηλώσεις από το νευρομυικό [Νευροπάθεια, άνοια (dementia)]
- Μεταβολικές και ενδοκρινικές διαταραχές





Αντιρετροϊκή αγωγή



1996: AZT-3TC-Indinavir

πρωί

μεσημέρι

βράδυ



2006: TDF-FTC-EFV

βράδυ

ATRIPLA
(efavirenz 600 mg / zidovudine 300 mg /
tenofovir disoproxil fumarate 300 mg) Tablets



Ζώντας με καλύτερα φάρμακα

-
-
-
-
-
-
-
-

Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιρετροϊκών και αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα



Browse all medications [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#)

[Home](#) [Drugs A-Z](#) [Pill Identifier](#) [Interactions Checker](#) [News](#) [Health Professionals](#)

Home → Drug Interaction Checker

[Print](#) [Share](#)

Drug Interactions Checker

Drug interactions occurs when the effect of a particular drug is altered when it is taken with another drug, or with food.

The Drug Interaction Checker explains the mechanism of each drug interaction, the level of



UNIVERSITY OF
LIVERPOOL

Welcome to Liverpool HIV iChart

Providing summary data of antiretroviral drug interactions. Full details available at www.hiv-druginteractions.org.

[Sponsors](#)



[Disclaimer](#)

[Start Drug Interactions](#)

Version: 1.0.0

**Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη
πεθαίνουν από καιροσκοπικές
λοιμώξεις παρά την αύξηση
της συνολικής επιβίωσης**

**ΜΥΘΟΣ για τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τον
ασθενή που λαμβάνει την αντιρετροϊκή
αγωγή του**



**Ποιό από τα παρακάτω δεν
αποτελεί πρόβλημα στα άτομα
που ζουν με HIV?**

Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί πρόβλημα στα άτομα που ζουν με HIV?

4. Φλεγμονώδεις εντεροπάθειες

Ο πληθυσμός των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV γερνάει πιο γρήγορα


Σε θεραπευόμενους HIV+ ασθενείς




Σε γηράσκοντες
HIV+ ασθενείς (>50 ετών)

Since the introduction of triple therapy, HIV mortality has been decreasing and life expectancy in PLHIV increasing

Global HIV statistics¹



Expected age at death of men and women living with HIV starting ART at the age of 20 years* by period of ART initiation³



*Established after 2nd and 3rd years of follow-up

ART, antiretroviral therapy; PLHIV, people living with HIV.

1. Roser M, Ritchie H. HIV/AIDS. Available at: www.ourworldindata.org/hiv-aids. Last accessed: August 2019; 2. Gulick RM, et al. *N Engl J Med* 1997;337:734-9; 3 Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. *Lancet HIV*; 2017;4:e349-56

Compared with the general population, comorbidities are more common and occur earlier in PLHIV



CVD

twice as likely to develop CVD¹



Bone fractures

50% more likely to develop a bone fracture²



Renal disease

twice as likely to have reduced renal function*³



Cancer

twice as likely to develop non-AIDS-defining cancer⁴



HBV/HCV coinfection

6.5-fold higher rates of HBV and 3.5-fold higher rates of HCV³



CNS impairment


diagnosed with HIV-associated neurocognitive disorders in 52–59% of cases in the US⁵



DDI

more likely to be affected by polypharmacy and DDIs⁶

- Comorbidities are linked with lifestyle-related risks, ageing, chronic inflammation/immune activation and long-term toxicities of some ART⁷
- Comorbidities interfere with clinical management and lead to increased HIV care costs⁸





ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Στην Αθήνα (ή άλλη πόλη) σήμερα/...../20....

ο/η υπογεγραμμένος/η όνομα επώνυμο
....., όνομα πατρός
εθνικότητας....., κάτοικος

με βάση νομιμοποιητικά έγγραφα / κατά δήλωση του εξεταζομένου/ης*


Δηλώνω με το παρόν έγγραφο, ότι συναινώ να μου γίνει αιμοληψία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είμαι θετικός στον ιό HIV/ AIDS. Η συναίνεση αυτή γίνεται με την ελεύθερή μου βούληση και αφού ενημερώθηκα πλήρως για κάθε σχετικό ζήτημα από τον επαγγελματία υγείας και απαντήθηκε κάθε σχετική ερώτησή μου. Το παρόν έγγραφο μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό δέχομαι να συνεργαστώ για τη διενέργεια επιβεβαιωτικού ελέγχου και γνωρίζω ότι θα τηρηθεί αυστηρά το ιατρικό απόρρητο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

* Συμπληρώνεται από τον επαγγελματία υγείας

**ΕΚ ΤΩΝ
προτέρων**


**Η εξάλειψη της διάκρισης
αποτελεί εν πολλοίς έναν
ακόμη μύθο**



Πυλώνες της στρατηγικής για την εξάλειψη της HIV λοίμωξης



You can be cured of HIV.



Despite a lot of scientific research, there is still no cure for HIV.

HIV treatment can get rid of most of the HIV in the body, but the virus never entirely disappears. It will still be present in some parts of the body, like the intestines. If you stop taking your anti-HIV drugs, HIV will start spreading throughout your body.



Fast-Track Targets

Στόχος 90-90-90 για το 2020:

- 90% των ατόμων που ζουν με τον HIV να το γνωρίζουν
- 90% αυτών να λαμβάνουν συστηματική θεραπεία
- 90% αυτών που λαμβάνουν θεραπεία να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο

by 2020

90-90-90

Treatment

500 000

New infections among adults

ZERO

Discrimination

by 2030

95-95-95

Treatment


200 000

New infections among adults

ZERO

Discrimination

The Full 360 is an expanded vision of the UNAIDS 90-90-90 targets including a target for lifelong good health in PLHIV^{1,2}



H

H

Σας ευχαριστώ

